

# Maisherbizide – Packübersicht Terbutylazin-haltig

Nr. 14b – 30.04.2024

Manuel Schmid, BAT Agrar Pflanzenbauberatung



Herbizid-Packs	Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	Wirkung auf																	Gewässer- abstand (m)		NG-Auflagen
		Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Flughafel	Hühnerhirse	Blut- und Fingerhirse	Borstenhirse	Amarant	Bingelkraut	Flohnöterich	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Kreuzkraut	Schwarzer Nachtschatten	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Randstreifenbreite bei Hangneigung > 2 %	Abdriftminderung (90 %)	
<b>Elumis Gold Pack <sup>1)</sup></b> (Elumis + Gardo Gold)	1,25 + 2,5	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	20	*	NG300 NG301-1 NG326-1 NG327
<b>Elumis Triumph Pack</b> (Elumis + Successor T)	1,25 + 2,5	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	20	*	NG326-1 NG327
<b>Laudis Aspect Pack</b>	2,0 + 1,5	xx	xx	(x)	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xx	10	*	-
<b>MaisTer power Aspect Pack</b>	1,25-1,5 + 1,25-1,5	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	20	*	-
<b>Successor Top 4.0</b> (Successor T + Haldis 100 SC)	3,0-4,0 + 0,75-1,0	(x)	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	20	*	-
<b>Zintan Gold Pack <sup>1)</sup></b> (Callisto + Gardo Gold)	0,75 + 3,0	(x)	xxx	(x)	xx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xx	10	*	NG300 NG301-1
<b>Zintan Saphir Pack</b> (Callisto + Spectrum Gold)	1,0 + 2,0	x	xxx	(x)	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xx	20	*	-

\*) länderspezifischen Gewässerabstand beachten

xxx sehr gute Wirkung

xx gute Wirkung

x geringe Wirkung

(x) Teilwirkung

<sup>1)</sup> Aufbrauchfrist Gardo Gold: 23.07.2024

**Hinweis:** Alle hier aufgeführten Packkombinationen sind von der Auflage NG362 betroffen!